

Písemka na opakování Analytické geometrie, Oktáva 2015/2016

Skupina A

Příklad 1

Určete obecnou rovnici přímky p tak, aby byla rovnoběžná s přímkou $q: x=1+3k, y=2+k$ a procházela bodem $A[1;2]$.

Obecná rovnice přímky je rovnice $ax + by + c = 0$, kde koeficienty a a b jsou dány normálovým vektorem přímky (vektorem kolmým na směr přímky), tedy $\vec{n}=(a;b)$ zadává směr přímky a koeficient c určuje umístění přímky v prostoru.

Přímka p rovnoběžná s q musí mít stejný směr (normálový vektor), jen jiné umístění. Přímka q je zadaná parametricky, máme tedy její směrový vektor, jehož složky tvoří násobky koeficientu k . Je tedy $\vec{s}_q=(3;1)$.

Hledáme normálový vektor, který je k \vec{s}_q kolmý. Jedním z možných kolmých vektorů je $\vec{n}_q=(-1;3)$. Jelikož $p \parallel q$, musí $\vec{n}_q = \vec{n}_p$. Dosadíme do rovnice: $-x + 3y + c = 0$. Směr přímky je určen, umístění v prostoru určuje podmínka, že $A \in p$. Dosadíme bod A do rovnice a dopočítáme koeficient c . $-1 + 3 \cdot 2 + c = 0$, tedy $c=-5$.

Řešení: $p: -x + 3y + -5 = 0$

Příklad 2

Určete vzdálenost přímky $p: x=3k, y=2-2k$ od bodu $[3;2]$.

Přímka je zadaná parametrickou rovnicí. Existuje vzorec pro vzdálenost bodu od přímky, kde do levé strany obecné rovnice přímky dosadíme souřadnice bodu a podělíme délkou normálového vektoru přímky, z výsledku bereme absolutní hodnotu (vzdálenost nemůže být záporná).

$d(A;p)=\frac{|a \cdot x_A + b \cdot y_A + c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ pro $A[x_A;y_A]$, $p: ax+by+c=0$

Převědeme rovnici na obecnou buď sečtením tak, aby se odečetla k , nebo nalezením kolmého vektoru ke směrovému a dosazením bodu. Každopádně: $x-3y+5=0$. Dosazením do vzorce

získáváme, že délka je 

Kdo si nepamatuje vzorec, ví, že vzdálenost bodu od přímky je délka úsečky dané oním bodem a

patou kolmice z bodu vedené k přímce. Určíme tedy kolmici k procházející bodem $A=[3;2]$, například obecnou rovnicí. Jelikož směrový vektor kolmice k musí být kolmý na směrový vektor přímky p a směrový a normálový vektor téže přímky jsou na sebe kolmé, pak normálový vektor kolmice k může být totožný se směrovým vektorem přímky p . Proto $3x-2y+c=0$. Dosazením bodu A dostáváme koeficient c
a tedy $k: 3x-2y-5=0$.

Stejně dobře bylo možné si říci, že směrový vektor přímky k kolmý na směrový vektor přímky p je třeba $(2;3)$ a proto parametrická rovnice kolmice je $k: x=3+2k, y=2+3k$.

Tak jako tak najdeme průsečík $k \cap p$ pomocí soustavy dvou rovnic pro přímky p a k . Bod $P=[\frac{27}{13};\frac{8}{13}]$;

Stačí určit $|AP|=\sqrt{(3-\frac{27}{13})^2+(2-\frac{8}{13})^2}\doteq 1,66$

From:
<http://wiki.gml.cz/> - **GMLWiki**

Permanent link:
<http://wiki.gml.cz/matematika:analytgeom:opakovacipisemka?rev=1441663841>

Last update: **08. 09. 2015, 00.10**

